



A vastagbél tükrözése (colonosopia) Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat

Kedves Betegünk!

A vizsgálat elvégzéséhez az Ön beleegyezése szükséges. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, ezen tájékoztatóban felvilágosítjuk a vizsgálat jelentőségéről, módjáról, esetleges szövődményeiről és a vizsgálat utáni teendőkről.

A colonosopia célja:

A vizsgálat lehetővé teszi, hogy az orvos felismerje a vastagbél rendellenességét (daganat, gyulladás, polyp, szűkület, vérzés). Emellett lehetőség nyílik arra, hogy biopsziás eszközzel kórszövettani vizsgálatra mintát vegyen, gyógyító beavatkozást (pl. polyp-levétel) végezzen.

Előkészítés:

Csak tiszta vastagbél vizsgálható, ezért az alapos előkészítés elengedhetetlenül fontos a sikeres colonosopia elvégzéséhez.

A vizsgálatot megelőző napon délelőtt hashajtót kell bevenni (Endostar, Picoprep, Moviprep, stb.). Kérjük pontosan kövesse az előkészítőhöz mellékelt betegtájékoztatót.

A hashajtó megfelelő hatásának kialakulásához biztosítani kell a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelt (3 liter), amely lehet szénsavmentes ásványvíz, tea.

A vastagbél tükrözés előtt étrendi megszorítások szükségesek, 1 héttel már ne fogyasszon apró magvas gyümölcsöt, magvas pékárut, paradicsomot, paprikát, rostos, nehezen emészthető ételeket.

Kérjük kerülni az előkészítés ideje alatt a rostos italok, tej, szőlő, dinnye, mogyoró, dió, mák fogyasztását. Éjfél-től enni, inni, dohányozni nem szabad!

A vizsgálat éhgyomorral történik, ezért a vizsgálat előtt 6-8 órával szilárd étel, 4 órával pedig folyadék sem fogyasztható.

Kivehető műfogsorát távolítsa el! Rendszeresen szedett gyógyszereit, tisztálkodási szereket, törölközőt, poharat, hálóinget/pizsamát, alsóneműt hozzon magával!

A vizsgálat reggelén a nővér tisztító beöntést fog adni Önnek.

Gyógyszerelés megváltoztatása:

Kérjük, jelezze, ha valamilyen gyógyszerre érzékeny!

Kérjük, hogy rendszeresen szedett gyógyszerei közül a szokott időben csak a vérnyomáscsökkentőket, szívgyógyszereit a vizsgálat napjának reggelén 6h-kor egy korty vízzel vegye be!

Amennyiben Ön cukorbeteg: cukorbetegségének kezelésére használt gyógyszerét ne vegye be, az inzulint ne adja be!



Cukorbetegség miatt szedett gyógyszereket, inzulint a vizsgálat után első étkezéshez időzítve folytassa.

Jelezze, ha tud vérzékenységről, illetve, ha véralvadásgátló gyógyszert szed.

A vizsgálat előtt 5 nappal alvadásgátló gyógyszerek (Plavix, Ticlid (clopidogrel, ticlopidin), Aspirin (acetyl-szalicilsav, Syncumar, Marfarin, Pradaxa, Xarelto- (acetokumarol, kumrin, dabigatran) felfüggesztése, illetve LMWHeparinnal történő helyettesítésük szükséges, amennyiben kardiológiai kontraindikációja nincs az elhagyásuknak.

Heparin injekcióját a vizsgálat napján ne adja be.

A gyógyszerek elhagyásának, illetve újrakezdésének időpontjáról és mikéntjéről a vizsgáló orvossal történt konzultáció alapján történik.

Vizsgálat:

A vizsgálat fekvő helyzetben történik. Az orvos a végbélen keresztül egy hajlékony optikai műszert vezet végig a vastagbélben. A beleket levegővel tágitjuk fel, ez székelési ingert, kisebb görcsöket, fájdalmat okozhat.

A vizsgálat időtartama: kb. 20-60 perc. Kérésére a vizsgálatot fájdalommentesen, éber szedációban (bódításban, felületes altatásban) vagy altatásban (narcosisban) végezzük. Az altatásban végzett tükrözés során az anaesthesiologus orvos a műtéti narcosisban is használt rövid hatású szerrel (Propofol) mély alvást tud előidézni, ezáltal a beavatkozás a beteg számára teljesen fájdalommentessé válik. A vizsgálat előtt altatóorvosi szakvizsgálat (labor, EKG, stb.) szükséges.

Altatásban végzett vizsgálat után a beteget monitorozzuk a Sebészeti Osztályunkon, majd altatóorvos és gasztroenterológus bocsátja el stabil, éber állapotban.

Lehetséges szövődmények:

Minőségi colonoscopyt végző intézményben a szövődmények ritkák (1000 esetben 1).

Előfordulhat az érzéstelenítőszer, vagy nyugtató iránti túlérzékenység, műszer okozta sérülés, szövettani mintavétel vagy polip levételét követően jelentkező vérzés vagy a tápcsatorna falának sérülése (1:2000). A kórszövettani mintavétel csak kisebb, átmeneti, magától megszűnő vérzést okozhat.

A szövődmények többsége endoscoposan elhárítható, illetve spontán megszűnik, ritka esetben azonban sürgős műtét is szükségessé válhat.

TEENDŐK VIZSGÁLAT UTÁN:

A vizsgálat után 2 órát az intézményben kell tölteni.

Amennyiben a beavatkozás altatásban történt a megfigyelési idő minimum 6 óra.

Közvetlenül a vizsgálat után: 2 órán keresztül enni, inni, felkelni nem szabad! Miután ez a 2 óra letelt és az orvos is engedélyezi: estig csak folyadékot (vizet, teát, cappuccinót) fogyaszthat. Ezen időtartam alatt rostos italok, kávé, szeszes ital fogyasztása nem javasolt!

Az étkezés időpontjáról a vizsgálat után kérjen tájékoztatást az ápolónőtől!



A vénába helyezett kanült az ápolónő közvetlenül a beteg hazamenetele előtt távolítja el!
Ha a vizsgálat során injekciót kapott, a reakciókészség csökkenése miatt a vizsgálat napján járművet nem vezethet!

Amennyiben a vizsgálat napján hazaengedjük, kísérőre lesz szüksége.

Otthonában könnyű, pépes ételek (pl.: krumplicsusz, főtt krumpli, tejbegríz, párolt hús, joghurt, virsli, parizer, kenyér) fogyasztása javasolt 1-2 napig. Ezen időtartam alatt rostos italok, kávé, szeszes ital, mûzli, nehéz, fûszeres, apró magvas, zsíros ételek fogyasztása nem javasolt!

Ha a vizsgálat után órákkal is érezne fájdalmat, görcsöket, vagy székletében vért észlelne, azonnal lépjen érintkezésbe gasztroenterológiai, vagy ügyeleti időben sürgõsségi ambulanciánkkal, illetve a vizsgálatot végzõ orvossal!

Biopsziás mintavétel vagy polyp-eltávolítás esetén kisebb vérzés nem jelent kórosat.

Nagyobb polyp-eltávolítást követõen 24-48 órát fekvõbeteg intézményben kell, hogy megfigyeljék!

Kérjük aláhúzással válaszoljon az alábbi kérdésekre:

tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységrõl: nem-igen

(ha igen, mely gyógyszerre?,,,,)

tud-e vérzékenységrõl? nem-igen

van-e epilepsziája? nem-igen

fennáll-e Önnél terhesség: nem-igen

van-e zöldhályogja? nem-igen

van-e beültetett szívritmus-szabályozója? nem-igen

van-e egyéb említésre méltó betegsége? nem-igen

(ha igen, mi az?,,)

szed-e véralvadástgátló gyógyszert? nem-igen

(ha igen, mi az?,,)



BELEEGYZÉSI NYILATKOZAT:

Alulírott Szül.idő.: Édesanyja neve:
ennek a nyilatkozatnak az aláírásával tanúsítom, hogy

1. A betegtájékoztatót elolvastam.
2. Ismertették, hogy a beavatkozás következményeként szövődmények léphetnek fel, ritkán orvosi kezelést is igénylő állapot alakulhat ki.
3. A beavatkozással kapcsolatos kérdéseimre választ kaptam.
4. A vizsgálat elutasításának lehetséges egészségügyi következményeiről tájékoztattak.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vizsgálatot visszautasítom, kezelőorvosomat nem terheli felelősség az emiatt fellépő káros következményekért, illetve betegségem kedvezőtlen alakulásáért.
5. A fenti tájékoztatás alapján, kellő mérlegelés után a vizsgálatba, illetve az esetleges szövődmények kezelésébe

beleegyezem / nem egyezem bele

(kérjük a megfelelőt aláhúzni)

Komló,.....

.....
Beteg illetve törvényes képviselője

.....
a beteget tájékoztató orvos vagy a nyilatkozattételre
jogosult cselekvőképes személy aláírása

.....
endoszkópos asszisztens