



Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat Gyomortükrözés

Kedves Betegünk! (Név: _____ ; Szül: _____)

Gyomortükrözés

A gasztro-duodenoszkópia, köznapi nevén gyomortükrözés, speciális vizsgálat a nyelőcső, a gyomornyálkahártya és a nyombél esetleges elváltozásainak felismerésére, egyes esetekben kezelésére.

Mit jelent a gaszroszkópia

A vizsgálat során vékony, hajlékony csövet juttatnak a gyomron át a nyombélbe, mely erős fényforrást és száloptikai vagy elektromos képtovábbító rendszert tartalmaz. Segítségével a nyálkahártya képe a TV képernyőjére továbbítható.

Miben segít a gaszroszkópia

A vizsgálat kimutathatja a fekélyes, gyulladós elváltozásokat a fájdalom hátterében, továbbá a daganatos betegségeket. Felfedezhető segítségével a H. pylori fertőzés, vagy kis szövetdarab emelhető ki további vizsgálatra (biopszia). Használatával kisebb elváltozások vagy idegen testek távolíthatók el. Alkalmos még vérzéscsillapításra vagy szűkületek tágítására is.

Felkészülés a vizsgálatra

Az alábbiakra kell ügyelnie a vizsgálat előtt:

1. Ne egyen, ne igyon semmit a vizsgálatot megelőző éjfél után. Ha vizsgálata délután kerül sorra, csak víztisztafolyadékot fogyasszon aznap, és azt is csak több, mint 4 órával a vizsgálat megkezdése előtt.
2. Hozza magával régebbi vizsgálati eredményeit is.
3. Mivel a kezelés során nyugtató készítményt is kaphat, készüljön fel arra, hogy nem vezethet haza egyedül.
4. Közölje orvosával, ha az alábbi állapotok közül valamelyik fennáll: gyógyszerérzékenység, légzési vagy keringési betegség, folyamatos gyógyszeresedés (pl.: véralvadásgátlók), terhesség.
- 5.

A vizsgálat menete

A vizsgálatot egy orvos és egy asszisztens végzi, ideje hozzávetőleg 15 perc. Az eljárás menete:

1. Fel kell feküdni a vizsgáló asztalra.
2. A garatot Lidocain spray befúvásával érzéstelenítik.
3. Ezután le kell nyelnie a vékony csövet, ennek keresztmetszete kisebb, mint a legtöbb lenyelt falaté -, a légzést nem akadályozza. Az előzetesen alkalmazott gyógyszerek megátolják a reflexes öklendezést.
4. Levegőt fújnak be a csövön, hogy a gyomor kitáguljon, és így jobban vizsgálható legyen. Ez böfögést válthat ki.
5. A kép az orvos előtt álló képernyőn jelenik meg, ha ébren van a vizsgálat alatt, meg is figyelheti saját szervezetének titkait.
6. A vizsgálat után rövid ideig pihenjen, majd hazamehet. Ha nyugtató készítményt kapott, nem szabad vezetnie.



A vizsgálat folyamán igen ritkán, de előfordulhatnak komplikációk:

1. túlérzékenység az érzéstelenítőszer vagy a nyugtató iránt
2. a szövetminta vételekor kisebb vérzés
3. a műszer okozta sérülés

Ezek előfordulási valószínűsége minimális (10.000 vizsgálatból egy esetben), ezek miatt ritkán sürgős műtét válhat szükségessé.

A vizsgálat után

A gasztroszkópia eredményeiről még aznap értesül. Ha biopszia is történt, ennek értékelése több napot vehet igénybe. Kövesse orvosa útmutatását az eredmények megismerésében.

Mikor forduljon orvoshoz

Azonnal forduljon orvosához, ha az alábbi tünetek jelentkeznek a vizsgálat után:

1. Vér a székletben
2. Láz
3. Hasi fájdalom

Fontos figyelmeztetés!

Ez a kiadvány nem helyettesíti az orvosi kezelést. Csak az Ön orvosai képesek a diagnózis felállítására és betegsége gyógykezelésére.

1999 StayWell Company.

Minden jog fenntartva. MediMedia Információs Kft.

Kérjük válaszoljon az alábbi kérdésekre:

	Igen	Nem	Megjegyzés:
Van-e gyógyszer túlérzékenysége?			
Van-e vérzékenysége?			
Van-e epilepsziája?			
Van-e zöldhályogja?			
Van-e egyéb betegsége?			
Fennáll-e terhessége?			
Szed-e véralvadásgátlót?			
Szed-e egyéb gyógyszereket?			
Van-e kérdése a vizsgálatral kapcsolatban?			
Az orvos válasza a beteg kérdéseire, ill. egyéb kiegészítései (az orvos tölti ki):			



Beleegyző nyilatkozat

A betegtájékoztató elolvasása és a szóbeli tájékoztatás után a javasolt endoszkópos vizsgálatba beleegyezem.

Komló,

A felvilágosítást végző orvos aláírása

A beteg vagy törvényes képv. aláírása